



**தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம்**

**வேளாண் வானிலை ஆலோசனை மையம், கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம், நாமக்கல் மற்றும மண்டல வானிலை மையம், இந்திய வானிலைத் துறை, சென்னை.**



**வேளாண் வானிலை ஆலோசனை அறிக்கை - நாமக்கல் மாவட்டம்**

எண்.49/2018

நாள் - 22.06.2018

அ) கடந்த மூன்று நாட்களுக்கான வானிலை - நாமக்கல் (19.06.2018 முதல் 21.06.2018 வரை)

மழையளவு (மி.மீ.)	0 - 0 - 0
அதிகபட்ச வெப்பநிலை	35.0°செ.(95.0°பா)
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை	24.0°செ.(75.2°பா)
மேகமூட்டம்	ஓரளவு மேகமூட்டம்
காற்றின் ஈரப்பதம்	42 - 89 %
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணிக்கு)	10
காற்றின் திசை	மேற்கிலிருந்து

ஆ) அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கான வானிலை

	23.06.2018	24.06.2018	25.06.2018	26.06.2018
1. மேகமூட்டம்	ஓரளவு மேகமூட்டம்	பொதுவாக மேகமூட்டம்	பொதுவாக மேகமூட்டம்	பொதுவாக மேகமூட்டம்
2. மழை (மி.மீ)	0	2	3	1
3. காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணிக்கு)	10	10	12	12
4. காற்றின் திசை	மேற்கிலிருந்து	மேற்கிலிருந்து	மேற்கிலிருந்து	மேற்கிலிருந்து
5. வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக	35.0°செ.(95.0°பா)	35.0°செ.(95.0°பா)	35.0°செ.(95.0°பா)	35.0°செ.(95.0°பா)
குறைந்தபட்சமாக	24.0°செ.(75.2°பா)	24.0°செ.(75.2°பா)	24.0°செ.(75.2°பா)	24.0°செ.(75.2°பா)
6.காற்றின் ஈரப்பதம் (%) அதிக அளவு	80	80	80	80
குறைந்த அளவு	60	60	50	50

**சிறப்பு வானிலை ஆலோசனை**

**கோழிப்பண்ணையாளர்களுக்கு:- (கா.தீ.ப.ம.த.உ.ஆ, நாமக்கல்)**

1. தென்மேற்கு பருவமழையின் தாக்கம் குறைந்தே காணப்பட்டாலும், அடுத்து வரும் நான்கு நாட்களுக்கும் காற்றின் வேகம் அதிகமாகவே காணப்பட்டு, வெப்ப அளவுகள் 35.0°செ.(95.0°பா) அளவிலேயே நிலவிவரும். காற்றின் ஈரப்பதம் சற்று உயர்ந்தே நிலவும். மழை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவாக இருப்பினும் ஓரிரு இடங்களில் மழைத்தூரல் இருக்கலாம். உயர்மனைகளில் அதிக காற்றினால் தீவன விரயமாகாமல் இருக்க பக்கவாட்டில் படுதா கட்டி வருவதை தொடர வேண்டும். மேலும், பண்ணைகளில் ஈக்களின் பெருக்கம் நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்ளவேண்டும்.

**கோழியின் நோய் கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு ஆய்வகம்:-**

2. கடந்த வாரம் இவ்வாய்வகத்தில் ஆய்வு செய்யப்பட்ட இறந்த கோழிகள் பெரும்பாலும் மேல்முச்சக் குழல் அயற்சி நோயின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது. எனவே பண்ணையாளர்கள் அதற்கு தகுந்தாற்போல் உயிர் பாதுகாப்பு முறைகளை கையாளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

**வேளாண் அறிவியல் நிலையம், நாமக்கல்:-**

3. தற்போது சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி செய்யும் பருவமாதலால், விதைப்பதற்கு 12 மணி நேரம் முன்பு, ஒரு ஏக்கருக்கு தேவையான 500 கிலோ விதை வெங்காயத்துடன் ஒரு கிலோ விதைக்கு 3 கிராம் டிரைக்கோடெர்மா விரிடி என்ற பூஞ்சான கொல்லி மருந்து கலந்து விதை நேர்த்தி செய்து விதைப்புச் செய்வது அவசியம்.

ஒருங்கிணைப்பாளர் & பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்,  
கால்நடைத் தீவனப் பகுப்பாய்வு மற்றும் தர உறுதிஆய்வகம்,  
வானிலை ஆலோசனை மையம், கால்நடை மருத்துவக்  
கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம், நாமக்கல் - 2.